



# CONVALESCENCE PLUS

## YOĞUN BAKIM VE TOPARLANMA DESTEĞİ

LİKİT — 30 ML × 6

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hastalık sonrası katabolik durumdan çıkış evresinde bağırsağın beslenmesi, yeme-içme isteğinin teşviki ve sıvı-elektrolit kaybının yerine konması için geliştirilmiş lezzetli likit destek formülüdür.



### NEREDE KULLANILIR?

- Parvoviral enterit ve akut gastroenterit nekahati
- Anoreksi ve iştahsızlık dönemlerinde besinsel destek
- Cerrahi ve yoğun bakım çıkışı
- Katabolik durumdan çıkış ve kas kaybının sınırlanması
- Sıvı ve elektrolit kaybının eşlik ettiği tablolar
- Enteral beslenmeye kademeli geçiş dönemi
- Kronik hastalıkta kondisyon kaybı
- Yaşlı hastada iştah ve hidrasyon desteği

### DOZAJ

**0-10 kg** 15 ml / gün

**10 kg ve üzeri** 30 ml / gün

**Kullanım süresi** En az 3-5 gün

### İÇERİK VE ETKİ MEKANİZMASI

| Bileşen                                              | Miktar / Tür                   | Etki mekanizması                                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enerji ve karbonhidrat</b>                        | 152 kcal · 10,6 g / 100 ml     | Toparlanma sürecinde hızlı kullanılabilir enerji sağlar; 5,9 g'ı şekerdir.                  |
| <b>Protein</b>                                       | 6,25 g / 100 ml                | Doku onarımı ve katabolik dönemde kas kaybının sınırlanmasına katkı.                        |
| <b>Yağ</b>                                           | 9,37 g / 100 ml                | Enerji yoğunluğu ve esansiyel yağ asidi desteği (3,1 g doymuş / 2,7 g tekli / 3,3 g çoklu). |
| <b>Sodyum · Potasyum · Klor</b>                      | 131 · 196 · 169 mg / 100 ml    | Kusma ve ishale kaybedilen elektrolitlerin yerine konmasına katkı.                          |
| <b>Lipozomal glutatyon</b>                           | 150 mg / 100 ml                | Yüksek biyoyararlanımlı hücresel antioksidan destek.                                        |
| <b>Taurin · Karnitin</b>                             | 32 · 12 mg / 100 ml            | Kalp ve göz sağlığı ile yağ asidi oksidasyonuna destek; kedide taurin esansiyeldir.         |
| <b>Kalsiyum · Fosfor · Magnezyum</b>                 | 106 · 100 · 32 mg / 100 ml     | Kemik sağlığı, enerji metabolizması ve kas fonksiyonu desteği.                              |
| <b>Vitamin kompleksi (A, D3, E, K1, C, B grubu)</b>  | C 84 mg · A 158 µg RE / 100 ml | Antioksidan koruma, bağışıklık ve enerji metabolizması desteği.                             |
| <b>İz elementler (Fe, Zn, Mn, Cu, I, Se, Cr, Mo)</b> | Fe 2 mg · Zn 1,8 mg / 100 ml   | Enzim kofaktörleri ve doku onarımı desteği.                                                 |

Kalori içeriği bir öğünün yerine geçmez: 30 ml yaklaşık 46 kcal sağlar; 10 kg'lık bir köpeğin dinlenme enerji gereksiniminin (yaklaşık 400 kcal) küçük bir bölümüne karşılık gelir. Ürün, beslenme planının tamamlayıcısıdır. Osmolarite 490 mOsm/kg olduğu için hızlı ve yüksek hacimli verildiğinde ozmotik ishal ve kusma görülebilir; günlük doz öğünlere bölünerek kademeli artırılmalıdır. Renal solüt yükü 511 mOsm/L'dir — böbrek yetmezliği olan hastada su dengesi gözetilmelidir.

Öğünlere ilave edilerek kullanılır. Bir kutu (6 × 30 ml) önerilen kullanım süresine denk gelir.

### KLİNİK VAKALAR VE BEKLENEN YANIT

#### 1 Parvoviral enterit nekahati — köpek

Sıvı tedavisi ve erken enteral beslenmenin üzerine eklenir; ürün öğün yerine değil öğüne ilave verilir.

**İlk 3-5 gün iştah ve hidrasyon desteği · kilo takibi günlük yapılır.**

#### 2 Anoreksik kedide beslenmeye köprü

Kedide 3 günü aşan anoreksi hepatik lipidoz riski taşır; asistan beslenme geciktirilmemelidir.

**İştah 48-72 saatte açılmazsa besleme tüpü değerlendirilmelidir.**

#### 3 Cerrahi ve yoğun bakım çıkışı

Katabolik dönemden çıkışta enerji, protein ve elektrolit desteği.

**3-5 günlük kullanım · kondisyon skoru ve kilo ile izlenir.**